

ACTO RATS - SOURIS Blocs appâts est un appât très appétent pour les rats et les souris grâce à sa **composition originale** à base de céréales liées par de la graisse animale et végétale.

Dès la première ingestion, le **brodifacoum, puissant anticoagulant** entraîne progressivement la mort par hémorragie interne (en 4 à 10 jours) sans éveiller la méfiance des autres rongeurs. ACTO RATS - SOURIS Blocs appâts est spécialement étudié pour la dératisation des **lieux humides** (caves...). Hydrofuge, l'humidité ne nuit pas à son appétence ni à son efficacité.

COMPOSITION : Brodifacoum (CAS n° 56073-10-0) 0,0012 % (m/m)
Contient un agent amérisant et un colorant.

HOMOLOGATION : FANGA B + BLOC P - N° AMM FR-2017-0038
Rodenticide (TP14), appât en bloc (BB) prêt à l'emploi.

MODE D'EMPLOI :

Méthode d'application :

Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.

Doses et fréquences d'application :

Contre les rats à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments : 200 grammes d'appât par poste d'appâtage. Contre les souris à l'intérieur uniquement : 40 grammes d'appât par poste d'appâtage. Si plusieurs postes d'appâtage sont nécessaires, la distance minimale séparant deux postes doit être de 5 à 10 mètres (pour le traitement contre les rats) et de 1 à 2 mètres (pour le traitement contre les souris). Les postes d'appâtage doivent être inspectés que 5 à 7 jours après le début du traitement (contre les rats) ou au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement (contre les souris), puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin. Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.

Délai nécessaire pour l'apparition de l'effet biocide :

En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.

Instructions d'utilisation :

Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser. Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple). Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile. Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée (par exemple parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers...). Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât. Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non-cibles. Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers. Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement. Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues ; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer.

Conditions de stockage :

Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage. Conserver à moins de 40°C.

Antidote : Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement. Contre-indication : Anticoagulants.



(réf. **HYDRO7**)
Etui de 240 g
(12 blocs de 20 g en sachet individuel)
Carton de 12

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

FDS disponible sur www.quickfds.fr